

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE** (Tél. 47-22-87)  
(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

**ABONNEMENT ANNUEL**  
**15 F**

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 46 de JUILLET 1964

le 20 Juillet 1964

## V I G N E

### AVERTISSEMENT.-

Vers de la grappe (Eudemis - Cochylis) (Rappel) :

Il est encore temps d'appliquer un traitement à l'aide d'un des produits "curatifs" énumérés dans notre avertissement du 8 juillet.

### INFORMATIONS.-

Acarieus - Araignées rouges - Araignées jaunes :

Surveiller les pullulations de la génération estivale et intervenir éventuellement à l'aide d'un produit adapté à l'état du parasite. Préférer les acaricides spécifiques aux produits "systémiques".

Cochenilles :

Un traitement à base d'esters phosphoriques doit être appliqué dans les vignobles contaminés.

## ARBRES FRUITIERS

### INFORMATIONS.-

Tavelures des arbres fruitiers :

Dans les vergers où ces maladies sont présentes, il est conseillé d'effectuer un traitement en fonction des pluies pour éviter les contaminations par conidies.

Araignées rouges :

Surveiller attentivement les vergers et en cas de nécessité utiliser de préférence, un acaricide spécifique à base de Tetradifon, de Dichlorophenyltrichloréthane ou le Prothoate.

1... P106



## GRAND CULTURE

### INFORMATIONS.-

#### Maladie du coeur de la betterave :

La persistance d'un temps chaud et sec laisse craindre une apparition prochaine de cette maladie, si des précipitations importantes n'interviennent pas avant fin Juillet.

C'est surtout en sols de craie et en sols sableux traditionnellement pauvres en bore, que des dommages sont à redouter et particulièrement sur défriches.

Une application de 7 à 8 kgs de borate de soude ou de 5 Kgs de pentaborate de soude par pulvérisation sur la base de 800 à 1000 litres/ha, permet généralement de limiter la maladie dans les cultures ayant reçu une fumure boratée avant semis.

#### Puceron cendré sur colza de printemps :

Les pullulations enregistrées sur les premiers colzas de printemps et qui ont occasionné des dégâts appréciables risquent de s'intensifier dans les cultures plus tardives, n'arrivant qu'en fin de floraison ou ne présentant encore que de jeunes siliques.

Bien que ce traitement soit difficilement réalisable, un poudrage au parathion sur la base de 200 gr. de matière active par hectare est susceptible de réduire les pullulations de pucerons de manière à permettre aux plantes d'arriver normalement à maturité. N'intervenir que sur colzas défloris.

Les contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire de REIMS,

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE Directeur-Gérant : L. BOUYX